

HASCON M10 Alta Densità

CONDUCE PROCESUL DE COACERE, ÎMBUNĂTĂȘTE
COLORAREA FRUCTELOR ȘI MATURAREA LEMNULUI

FERTILIZANT UE

în conformitate cu Reg. UE 2019/1009

HASCON M10 Alta Densità, datorită tehnologiei exclusive de producție, are un raport unic de macronutrienți $N:P_2O_5:K_2O=0:3:4$. Acest procent asigură culturilor mesajul chimic specific care duce la activarea procesului care controlează stadiul de coacere.

Adăugarea microelementelor ca bor, mangan și molibden sub formă sinergică asigură absorbția imediată în plante a tuturor elementelor nutriționale.

Aplicat după recoltare, **HASCON M10 Alta Densità** asigură o rezistență mai bună la îngheț și deschiderea mai multor muguri în următorul sezon.

Puritatea materiilor prime și a formulelor asigură miscibilitatea perfectă a **HASCON M10 Alta Densità**, atât în ape bogate în bicarbonat, carbonat, cât și în ape cu „Procent ridicat de absorbție a sodiului”.

COMPOZIȚIE % g/g (echivalent % g/v la 20°C)

Pentoxid de fosfor total (P_2O_5)	15% g/g (21% g/v)
Oxid de potasiu (K_2O) hidrosolubil	20% g/g (28% g/v)
Bor (B) hidrosolubil	0.01% g/g (0.014% g/v)
Cupru (Cu) chelat cu EDTA, hidrosolubil	0.01% g/g (0.014% g/v)
Mangan (Mn) chelat cu EDTA, hidrosolubil	0.1% g/g (0.14% g/v)
Molibden (Mo) hidrosolubil	0.01% g/g (0.014% g/v)

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

Densitate (20°C): 1.40 g/ml
pH (1% g/g soluție apoasă): 7.0 ± 0.5 u. pH
Conductivitate electrică (1 g/l soluție apoasă): 550 $\mu S/cm$



AVANTAJE HASCON M10 Alta Densità

1
Coacerea naturală
a fructelor

2
Intensifică culoarea
fructului

3
Îmbunătățește
maturarea lemnului

DOZE DE APLICARE

CULTURI	DOZE FOLIAR*	FAZE ȘI RECOMANDĂRI
SEMINȚOASE	3 - 5 l/ha	45 - 30 - 20 zile înainte de recoltare, după recoltare
SÂMBUROASE	3 - 5 l/ha	30 - 20 - 10 zile înainte de recoltare, după recoltare
KIWI	3 - 5 l/ha	40 - 20 zile înainte de recoltare
CITRICE	3 - 5 l/ha	De la începutul coacerii până la finalul coacerii
STRUGURI DE VIN	3 - 4.5 l/ha	De la legarea fructelor până la finalul coacerii și după recoltare.
STRUGURI DE MASĂ	3 - 5 l/ha	La strugurii de vin, produsul poate fi aplicat la volum mic (100-200 l de apă/ha)
TOMATE	10 l/ha	Prima aplicare la coacerea primului ciorchine; A doua aplicare după 10-15 zile A treia aplicare după 10-15 zile
HORTICULTURĂ ÎN SERĂ (solanacee și cucurbitacee)	200 - 300 ml/hl	De la începutul coacerii până la maturitate
LEGUME CU FRUNZE	2 l/ha	Cu 10 zile înainte de recoltare
BULBI ȘI TUBERCULI (cartofi)	4 l/ha	Prima aplicare la înflorirea completă A doua aplicare după 10 zile
CĂPȘUNI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI	300 - 400 ml/hl	De la legarea fructelor la fiecare 12-15 zile
PLANTE ORNAMENTALE, FLORI ȘI PEPINIERE	1 - 1.5 l/ha	Pentru întărirea tulpinii, creșterea frunzelor și intensificarea culorii
CULTURI DE CÂMP (sfeclă de zahăr, floarea soarelui, cereale etc.)	2 - 5 l/ha	De la începutul înfloririi conform nevoilor culturii

*Aplicarea foliară face referire la volumul standard de apă

Fertirigare: folosiți produsul în concentrație de 2 - 3‰ pentru un procent de 15-20 l/ha tratat